

# 登録速報

(制限登録を含む)

農薬名：ベンレート水和剤（登録番号：第 20889 号）（住友化学(株)登録）

適用拡大登録月日：平成 26 年 9 月 24 日

適用拡大登録内容：

- 作物名「小麦」の適用病害虫名「赤かび病」の本剤の使用回数を「3 回以内」から「2 回以内」に変更する。
- 作物名「えんどうまめ」の使用時期を「収穫 7 日前まで」から「収穫 14 日前まで」に変更する。
- 作物名「かんきつ（みかんを除く）」の本剤の使用回数およびベノミルを含む農薬の総使用回数を「4 回以内」から「2 回以内」に変更する。
- 作物名「かんきつ（みかんを除く）」の適用病害虫名「そうか病」、「灰色かび病」を削除する。
- 作物名「かんきつ（みかんを除く）」の使用時期を「収穫 7 日前まで」から「収穫前日まで」に変更する。
- 作物名「かき」の使用時期を「収穫 7 日前まで」から「収穫前日まで」に変更する。
- 作物名「ぶどう」の適用病害虫名「つる割病」の希釈倍数または使用量を「500 倍」から「200~500 倍」に変更する。
- 作物名「くり」の使用時期「裂果まで」を「裂果前 但し、収穫 14 日前まで」に変更する。
- 作物名「豆類（未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどうを除く）」、「えだまめ」、「さやいんげん」、「さやえんどう」に適用病害虫名「立枯病」、使用方法「灌注」を追加し、ベノミルを含む農薬の総使用回数を「4 回以内（種子粉衣は 1 回以内、散布は 3 回以内）」から「6 回以内（種子粉衣は 1 回以内、灌注は 2 回以内、散布は 3 回以内）」に変更する。
- 作物名「茶」の使用方法「散布」の使用時期を「摘採 21 日前まで」から「摘採 14 日前まで」に変更する。
- 作物名「ネクタリン」を追加する。
- 作物名「いちじく」を追加する。
- 作物名「ほうれんそう」を追加する。
- 作物名「甘長とうがらし」を追加する。

## 【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 または 使用量	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ベノミル を含む 農薬の 総使用回数
小麦	赤かび病	2000~3000 倍	60~150 L/10a	収穫 7 日前 まで	2 回以内	散布	4 回以内（種子への 処理は 1 回以 内、は種後は 3 回 以内）
	雪腐病			根雪前	1 回		
えんどうまめ	菌核病 褐紋病	1000~2000 倍	100~300 L/10a	収穫 14 日 前まで	4 回以内		5 回以内 （種子粉衣は 1 回以内、は種 後は 4 回以内）

かんきつ (みかんを除く)	貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病) 貯蔵病害(軸腐病) 貯蔵病害(炭疽病) 貯蔵病害(黒斑病)	4000~6000倍	200~700 L/10a	収穫前日まで	2回以内	2回以内		
かき	落葉病 うどんこ病 炭疽病	2000~3000倍		収穫45日前まで	6回以内		6回以内	
ぶどう	褐斑病 うどんこ病 灰色かび病 晩腐病			2000倍	休眠期		3回以内	4回以内 (休眠期処理は1回以内、 散布は3回以内)
	黒とう病			200~500倍			1回	
	つる割病			200倍	3回以内			
	枝膨病			200~500倍	4回以内			
	芽枯病			2000倍	3回以内			
くり	実炭疽病		2000~3000倍	裂果前 但し、 収穫14日前まで	4回以内	4回以内		
豆類 (未成熟、ただし、 えだまめ、 さやいんげん、 さやえんどう を除く)	菌核病	2000倍	100~300 L/10a	収穫30日前まで	3回以内	6回以内 (種子粉衣は1回以内、 灌注は2回以内、 散布は3回以内)		
	立枯病	1000倍	3L/m <sup>2</sup>	発芽14日後まで	2回以内		灌注	
えだまめ	菌核病 紫斑病	2000倍	100~300 L/10a	収穫30日前まで	3回以内		散布	
	立枯病	1000倍	3L/m <sup>2</sup>	発芽14日後まで	2回以内		灌注	
さやいんげん	菌核病	2000倍	100~300 L/10a	収穫開始 14日前まで	3回以内		散布	
	立枯病	1000倍	3L/m <sup>2</sup>	発芽14日後まで	2回以内		灌注	
さやえんどう	菌核病	2000倍	100~300 L/10a	収穫前日まで	3回以内		散布	
	立枯病	1000倍	3L/m <sup>2</sup>	発芽14日後まで	2回以内		灌注	

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 または 使用量	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ペノミル を含む 農薬の 総使用回数
茶	炭疽病 白星病 輪斑病 褐色円星病	2000~3000倍	200~400 L/10a	摘採14日前まで	1回	散布	1回
	白紋羽病	1000~2000倍	—	—		苗木根部 24時間浸漬	

ネクタリン	灰星病 黒星病 桿状腐敗病	2000~3000 倍	200~700 L/10a	収穫3日前 まで	3回以内	散布	3回以内
いちじく	枝枯病	1000倍	1~10 L/樹	収穫30日 前まで	5回以内	株元灌注	5回以内
ほうれんそう	萎凋病	2000倍	3L/m <sup>2</sup>	収穫21日 前まで	2回以内	灌注	3回以内 (種子粉衣は 1回以内、 は種後は 2回以内)
甘長とうがらし	炭疽病	2000倍	100~300 L/10a	収穫前日ま で	3回以内	散布	4回以内 (種子粉衣は 1回以内、 は種後は 3回以内)

注意事項の変更：なし

以上