

登 録 速 報

農 薬 名：ダコニールエース（登録番号：第 20169 号）（北海道限定）

（株）エス・ディー・エス バイオテック登録）

適用拡大登録月日：平成27年5月27日

適用拡大登録内容：

- 作物名「かぼちゃ」に「黒斑病」を追加する。

【変更後】

作物名	適用 病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用方法	TPNを含む 農薬の 総使用回数
稲 (箱育苗)	苗立枯病 (リゾプス菌)	1000 倍	育苗箱(30× 60×3cm、使用 土壌約5L)1 箱当り500mL	は種時	1 回	土壌灌注	2 回以内
小麦	縞萎縮病	20～30 倍	80～100L /10a	は種前	1 回	全面散布後 土壌混和	1 回
きゅうり	べと病	1500 倍	100～300L /10a	収穫前 日まで	8 回以内	散布	10 回以内(土壌 灌注は2回以内、 散布及びくん煙 及びエアゾル剤 の噴射は合計8 回以内)
トマト	疫病 葉かび病				4 回以内		6 回以内(土壌灌 注は2回以内、散 布及びくん煙及 びエアゾル剤の 噴射は合計4回 以内)
すいか メロン	つる枯病			5 回以内	5 回以内		
たまねぎ	べと病 黄斑病 灰色かび病			750 倍 750～1500 倍	収穫7日 前まで 6 回以内		6 回以内
作物名	適用 病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用方法	TPNを含む 農薬の 総使用回数
アスパラガス	茎枯病	1500 倍	100～400L /10a	収穫前 日まで	3 回以内	散布	3 回以内
	斑点病	16 倍	3.2L/10a	収穫7日 前まで		無人ヘリコプタ ーによる 散布	
茶	炭疽病	1500 倍	200～400L /10a	摘採10 日前ま	1 回	散布	1 回

				で		
にんじん	黒葉枯病	750~1500 倍	100~300L /10a	収穫 7 日 前まで	5 回以内	5 回以内 (種子への 吹き付け処理 は 1 回以内)
	黒斑病	750 倍				5 回以内
ばれいしょ	疫病	750~1500 倍	25L/10a			5 回以内
		125 倍			5 回以内	
せんきゅう	夏疫病	750 倍	100~300L /10a		3 回以内	
かぼちゃ	べと病	1000 倍				
	うどんこ病 黒斑病	1500 倍			3 回以内	

注意事項の変更：なし

以 上