

登録速報

農 薬 名：ボデーガードジャンボ（登録番号：第 22617 号）

(パ[®]イェルクロップサイエンス(株)登録)

適用拡大登録月日：平成27年7月22日

適用拡大登録内容：

- 適用土壌、適用地帯の区分を廃止する

【変更後】

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植 水稲	水田一年生雑草 及び マツバ [®] イ ホタル [®] イ ヘラオモダ [®] カ ミズガヤツリ ウリカ [®] ワ クログ [®] ワ オモダ [®] カ ヒルムシロ セリ エゾノササカ [®] グサ コウキヤ [®] ガラ シズ [®] イ	移植後5日～ ル [®] ィエ2.5葉期 ただし、 移植後30日まで	小包装 (パ [®] ック) 10個 (400g)/10a	1回	水田に小包装(パ [®] ック) のまま投げ入れる。
直播 水稲	水田一年生雑草 及び マツバ [®] イ ホタル [®] イ ミズガヤツリ ウリカ [®] ワ ヒルムシロ セリ	稲1葉期～ ル [®] ィエ2.5葉期 ただし、 収穫90日前まで			
テフルトリオンを含む農薬の総使用回数			フェントラザミド [®] を含む農薬の総使用回数		
2回以内			1回		

注意事項の変更：

【削除事項】

- 本剤は、移植前に生育したミズガヤツリには効果が劣るので、物理的防除方法などを用いて移植前に防除してから使用すること。

【変更後】

- 本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、移植水稻については田植え5日後からノビエの2.5葉期までに、直播水稻については稲1葉期からノビエの2.5葉期までに時期を失しないように散布すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に散布するようにすること。ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、エゾノサヤヌカグサは2葉期まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生前から再生始期まで、クログワイ、オモダカ、コウキヤガラ、シズイは発生始期までが本剤の散布適期である。クログワイ、オモダカ、コウキヤガラ、シズイは発生期間が長く、遅い発生のものまでは十分な効果を示さないので、必要に応じて有効な後処理剤と組み合わせて使用すること。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意するほか、別途提供されている技術情報も参考にして使用すること。特に初めて使用する場合や異常気象の場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

以 上