

登録速報

農薬名：ポデーガード1キロ粒剤（登録番号：第22612号）

（パイルクロップサイエンス(株)登録）

適用拡大登録月日：平成27年7月22日

適用拡大登録内容：

- 適用土壌、適用地帯の区分を廃止する。

【変更後】

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植 水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミスガヤツリ ウリカ ヒルムシロ セリ クダマ オモダカ エゾノササガサ シズイ コウキガウ	移植時	1kg/10a	1回	田植同時 散布機で施用
		移植直後～ ルビエ3葉期 ただし、 移植後30日まで			湛水散布
直播 水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ミスガヤツリ ウリカ	稲1葉期～ ルビエ2.5葉期 ただし、 収穫90日前まで			

テフルトリオンを含む農薬の総使用回数	フェントサミドを含む農薬の総使用回数
2回以内	1回

注意事項の変更：

【削除事項】

- 本剤は、移植前に生育したミスガヤツリには効果が劣るので、物理的防除方法などを用いて移植前に防除してから使用すること。

【変更後】

- 本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、移植水稻についてはノビエの3葉期までに、直播水稻については稲1葉期からノビエの2.5葉期までに時期を失ないように散布すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に散布するようにすること。ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、エゾノサヤヌカグサ、ウリカワは2葉期まで、クログワイ、オモダカ、コウキヤガラは発生始期まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生前から再生始期まで、シズイは草丈3cmまでが本剤の散布適期である。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意するほか、別途提供されている技術情報も参考にして使用すること。特に初めて使用する場合や異常気象の場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

以 上