

登録速報

農 薬 名：クミアイサキドリ1キロ粒剤（登録番号：第 21403 号）

適用拡大登録月日：平成27年9月9日

適用拡大登録内容：

- 使用時期「移植直後～ノビエ1葉期 ただし、移植後30日まで」を「植代後～移植前7日または 移植直後～ノビエ1葉期 ただし、移植後30日まで」とする。
- 適用土壌及び適用地帯を削除する。

【変更後】

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植 水稻	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミスガヤツリ クログワイ コウキヤガラ	植代後～移植前7日 または 移植直後～ノビエ1葉期 ただし、移植後30日まで	1kg/10a	1回	湛水散布
		移植時			田植同時散布 機で施用

フタクロルを含む農薬の総使用回数	ペントキサボンを含む農薬の総使用回数
2回以内	2回以内

注意事項の変更：

【変更後】

- 使用量に合わせ秤量し、使いきること。
- 本剤は雑草の発生前から発生始期に有効なので、ノビエの1葉期までに時期を失ないように散布すること。なお、多年生雑草は、生育段階によって効果にフレが出るので、必ず適期に散布するように注意すること。ホタルイ、ミスガヤツリは発生始期まで、ヘラオモダカは発生前から発生始期まで、クログワイ、コウキヤガラは発生前が本剤の散布適期である。
- クログワイ、コウキヤガラは発生が長く、遅い発生のものまでは十分な効果を示さないので、必要に応じて有効な後処理剤との組み合わせで使用すること。
- 苗の植え付けが均一になるように、整地、代かきはていねいに行い、ワラくずなどの浮遊物は

できるだけ取り除くこと。また、未熟有機物を施用した場合は特にていねいに行うこと。

- 散布に当たっては、水の出入りを止めて湛水状態のまま本剤を田面に均一に散布し、少なくとも3～4日間は通常の湛水状態（水深3～5cm程度）を保ち、田面を露出させたり、水を切らしたりしないよう注意し、また、散布後7日間は落水、かけ流しはしないこと。
- 苗が水没するような深水状態では、葉鞘部に軽い褐変症状が出るおそれがあるので水管理に注意すること。
- 散布数日以内の梅雨明けなどによる異常高温では、初期生育の抑制が生じるおそれがあるので使用しないこと。
- 散布後に多量の降雨が予測される場合は、防除効果が低下することがあるので使用をさけること。
- 以下の水田では初期生育の抑制を生じるおそれがあるので使用をさけること。
 - 砂質土壌の水田及び漏水田（減水深2cm/日以上）
 - 軟弱徒長苗を移植した水田
 - 極端な浅植えや深植えをした水田
- れんこん、くわい、せりなどの生育を阻害するおそれがあるので、これらの作物の生育期に隣接田で使用する場合は十分注意すること。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

以 上