

各位

平成28年5月11日

クミアイ化学工業株式会社

登録速報

農薬名：サンダーボルト007（登録番号：第21072号）（日本農薬(株)登録）

適用拡大登録月日：平成28年5月11日

適用拡大登録内容：

●使用量(薬量)の変更：水田作物(水田刈跡)、多年生雑草/ 500~1000mL/10a⇒500~2000mL/10a

●グリサートを含む農薬の総使用回数の変更：

水田作物(水稻を除く)、移植水稻/1回⇒2回以内

直播水稻/耕起栽培は2回以内(耕起前は1回以内)、乾田不耕起栽培は2回以内⇒2回以内

水田作物(水田畦畔)、水田作物、畑作物(休耕田)/2回以内⇒3回以内

【変更後】

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリサートを含む農薬の総使用回数	ピラフルフェンエチルを含む農薬の総使用回数	
				薬量	希釈水量					
水田作物 (水田刈跡)	水田刈跡	一年生雑草 多年生雑草	雑草生育期	400~600 ml/10a	100 L/10a	1回	雑草茎葉散布	1回	1回	
水田作物 (水稻を除く)	—	一年生雑草	耕起20~ 10日前 (雑草生育期)	500~2000 ml/10a						2回以内
移植水稻				400~600 ml/10a						
直播水稻						2回以内				
水田作物 (水田畦畔)	水田畦畔	一年生 及び 多年生 雑草	収穫14日前 まで (雑草生育期： 草丈30cm 以下)	500~1000 ml/10a		2回 以内		3回以内		2回以内
水田作物、 畑作物 (休耕田)	休耕田		雑草生育期 (草丈50cm 以下)							

注意事項の変更：

【変更後】

- 土壌が流亡したり、くずれたりするおそれのある所では使用しないこと。
- 激しい降雨が予想される場合は使用をさけること。
- 作物の出芽前に使用する場合は、作物の出芽後に散布すると薬害を生じるおそれがあるので、必ず出芽前に散布すること。

- 農作物や有用植物にかかると強い薬害を生じるので、風向きなどに十分注意してかからないように散布すること。
- 水田への飛散、流入等により水稻に薬害が生じるので十分注意すること。

以 上