

登録速報

下記の通り、適用拡大登録となりましたので、ご連絡します。

記

農 薬 名：カスケード乳剤（登録番号：第 18500 号）
（BASFジャパン(株)登録）

適用拡大登録月日：平成28年11月2日

適用拡大登録内容：

- 「かんきつ」に適用病害虫名「ヨモギイタシク」、希釈倍数「4000倍」を追加する。
- 「トマト」及び「ミニトマト」に適用病害虫名、「ハスモンヨウ」、「トマトビダニ」、希釈倍数「4000倍」を追加する。
- 「さやえんどう」「実えんどう」「そらまめ」「未成熟そらまめ」「さやいんげん」「あずき」に適用病害虫名「ハスモンヨウ」、希釈倍数「4000倍」を追加する。
- 作物名「りんどう」を追加する。

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルフェノクスロンを含む農薬の総使用回数	
りんご	ナミハダニ リンゴハダニ	2000倍	200～700 L/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内	
	キンモンホリガ ギンモンハモクリガ	2000～4000倍						
	ハマキムシ類	2000～6000倍						
	ヨモギエダシヤク	4000倍						
なし	ハダニ類 ハマキムシ類	2000倍						
もも	ハダニ類	2000～4000倍						
	ハマキムシ類							
	モモハモクリガ							
小粒核果類	ケムシ類	2000倍						
ネクタリン	ハダニ類	4000倍						収穫21日前まで
	ハマキムシ類	2000～4000倍						
	モモハモクリガ	4000倍						
おうとう	ハマキムシ類 ヒメシロモントウガ	2000～4000倍						収穫7日前まで
かんきつ	ミカンハモクリガ チャノキイロアザミウマ ミカンサビダニ	4000倍						
	ヨモギエダシヤク	1000～2000倍						
	ミカンハダニ	4000倍						
かき	カキハタムシガ	2000～4000倍	収穫14日前まで					
	カキクダアザミウマ	2000倍						
マンゴー	チャノキイロアザミウマ	2000倍	収穫3日前まで					
食用さくら(葉)	アザミウマ類	2000倍	収穫7日前まで					
茶	チャノコカクモンハマキ チャノホソガ チャノミトリヒメヨコバイ チャハマキ ヨモギエダシヤク チャノキイロアザミウマ チャノホコリダニ チャノナガサビダニ ツマクノアオカスミカメ	200～400 L/10a	摘採7日前まで					
キャベツ	コナガ アオムシ タマナギンウワバ ハスモンヨトウ ヨトウムシ ハイマダノラノメイガ	2000～4000倍	100～300 L/10a	収穫7日前まで				
はくさい	コナガ アオムシ ヨトウムシ							
だいこん	アオムシ コナガ	2000～4000倍			収穫14日前まで	3回以内		
はつかだいこん	ハイマダノラノメイガ				4000倍	1回		
わさびだいこん	コナガ				2000～4000倍	収穫7日前まで	3回以内	

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルフェノクスロンを含む農薬の総使用回数
非結球 あぶらな科 葉菜類	コナガ アオムシ マメハモクダシ	2000倍	100～300 L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内
なばな類	ヨウムシ類 ハモクダシ類	2000～4000倍		収穫21日前まで	3回以内		3回以内
ブロッコリー	ハスモンヨトウ	4000倍		収穫7日前まで	2回以内		2回以内
レタス 非結球レタス くちしや	ハスモンヨトウ オオタバコガ			収穫3日前まで	3回以内		3回以内
トマト	マメハモクダシ オオタバコガ	2000～4000倍		収穫前日まで	4回以内		4回以内
	ハスモンヨトウ トマトサビダニ	4000倍					
	ミカンキロアザミウマ トマトハモクダシ	2000倍					
ミニトマト	マメハモクダシ オオタバコガ	2000～4000倍					
	ハスモンヨトウ トマトサビダニ	4000倍					
	ミカンキロアザミウマ トマトハモクダシ	2000倍					
なす	ミナミキロアザミウマ	2000～4000倍					
	マメハモクダシ ハダニ類	2000倍					
ピーマン	ミナミキロアザミウマ	4000倍					
	オオタバコガ	2000倍					
ししとう							
甘長とうがらし	ミナミキロアザミウマ						
せり科葉菜類 (みつば、 パセリ、セルリー を除く)	ハスモンヨトウ	4000倍		収穫7日前まで	2回以内		2回以内
パセリ				1回	1回		
セルリー	マメハモクダシ コナジラミ類 ハスモンヨトウ			収穫14日前まで	3回以内		3回以内
みつば	ハスモンヨトウ ハダニ類 キアゲハ	2000倍		収穫7日前まで 但し、 伏せ込み栽培は 伏せ込み前まで	2回以内		2回以内
ねぎ	シロイロアザミウマ ネギハモクダシ ネギアザミウマ	4000倍	収穫14日前まで	3回以内	3回以内		
いちご	ハスモンヨトウ ミカンキロアザミウマ						
きゅうり	ミナミキロアザミウマ	2000～4000倍	収穫前日まで	4回以内	4回以内		
	ウリノメイガ トマトハモクダシ	2000倍					

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルフェノクスロンを含む農薬の総使用回数				
すいか	ミナキイロアザミウマ オオタバコガ マメハモクグリハエ	2000～4000倍	100～300 L/10a	収穫7日前まで	4回以内	散布	4回以内				
	シロイチモジヨトウ	4000倍									
メロン	ミナキイロアザミウマ	2000～4000倍									
	タバコナジラミ類 (シルバリーフ コナジラミを含む) トマトハモクグリハエ	2000倍									
	トマトハモクグリハエ	2000～4000倍									
かぼちゃ	トマトハモクグリハエ	2000～4000倍						収穫前日まで	1回	3回以内	3回以内
うり類(漬物用) (しろうり、 とうがんを 除く)	ミナキイロアザミウマ	2000倍						収穫3日前まで			
しろうり	ウリノメイガ ミナキイロアザミウマ	2000倍						収穫前日まで	3回以内	3回以内	3回以内
とうがん	ミナキイロアザミウマ							収穫3日前まで			
にがうり	マメハモクグリハエ ウリノメイガ アザミウマ類	2000～4000倍						収穫前日まで	4回以内	4回以内	4回以内
ズッキーニ	トマトハモクグリハエ	2000倍						収穫7日前まで	2回以内	2回以内	2回以内
未成熟 とうもろこし	アウノメイガ	2000～4000倍									
	オオタバコガ	4000倍									
てんさい	ヨトウムシ	2000～4000倍	25L/10a	収穫7日前まで	4回以内	4回以内					
	シロヒノメイガ テンサイメイグリハナハエ カメコハムシ ナミダニ アシクワハモクグリハエ	4000倍									
	ヨトウムシ	1000倍									
	ヨトウムシ	1000倍									
アスパラガス	ハスモンヨトウ オオタバコガ アザミウマ類	4000倍	収穫前日まで	2回以内	2回以内	2回以内					
しゅんぎく	マメハモクグリハエ アザミウマ類 ハスモンヨトウ ヨトウムシ	2000～4000倍	収穫7日前まで								
ほうれんそう	ハスモンヨトウ マメハモクグリハエ シロヒノメイガ ナミダニ アシクワハモクグリハエ	4000倍	収穫3日前まで	3回以内	3回以内	3回以内					

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルフェナクスロンを含む農薬の総使用回数
さやえんどう 実えんどう	シロイモジ ^{ヨトウ} ハスモンヨトウ	4000 倍	100~300 L/10a	収穫前日まで	2 回以内	散布	2 回以内
そらまめ 未成熟そらまめ	マメハモク ^{リハエ} ハスモンヨトウ	2000 倍 4000 倍			3 回以内		3 回以内
さやいんげん	マメハモク ^{リハエ} ハスモンヨトウ	2000 倍 4000 倍			2 回以内		2 回以内
未成熟ささげ 未成熟ふじまめ	ハスモンヨトウ	3000 倍					
えだまめ だいず	ハスモンヨトウ ウコンノメイガ カメムシ類	4000 倍					
あずき	ナミハダ ^ニ アズキノメイガ ハスモンヨトウ						
みょうが (花穂)	ハスモンヨトウ	2000 倍		収穫前日まで	3 回以内	散布、 但し 花穂の 発生期 にはマルチ フィルム 被覆に より散布 液が直接 花穂に 飛散しな い状態で 使用する	3 回以内
みょうが (茎葉)				みょうが(花穂) の収穫前日まで 但し、花穂を収 穫しない場合に あつては開花期 終了まで			
しそ(花穂) しそ科葉菜類 (バジルを除く)	ハスモンヨトウ マメハモク ^{リハエ} ヨトウムシ ハスモンヨトウ ナガジ ^{ロシタバ} ハスモンヨトウ	4000 倍		収穫 3 日前まで	2 回以内	散布	2 回以内
バジル				収穫前日まで			
にんじん				収穫 7 日前まで			
タラゴン							
つるむらさき ゆきのした ふだんそう モロヘイヤ							
かんしょ				収穫 3 日前まで			
食用トレニア				収穫 3 日前まで			
食用ミニバラ			収穫 14 日前まで				
きく(葉)			収穫 7 日前まで				
食用ぎく			収穫 7 日前まで				

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルフェノクスロンを含む農薬の総使用回数
きく ガーベラ	マハモク リハエ ミカンキロアザミウマ	2000 倍	100~300 L/10a	—	3 回以内	散布	3 回以内
ばら	ハダニ類	1000 倍					
	ミカンキロアザミウマ	2000 倍					
宿根かすみそう	シロイモジヨトウ	4000 倍					
スターチス	ハスモンヨトウ	2000 倍					
ソリダゴ	シロイモジヨトウ ハスモンヨトウ						
宿根アスター	シロイモジヨトウ						
はぼたん	コナガ						
けいとう	シロヒメノメイガ						
カーネーション ほおずき	タハコガ						
りんどう	リンドウウチソハマキ	4000 倍					

注意事項の変更：

なし

以 上