

登録速報

下記の通り適用拡大登録となりましたので、ご連絡します。

記

農薬名：ヤブサメ豆つぶ250（登録番号：第23552号）（北海道限定）

適用拡大登録月日：平成28年11月30日

適用拡大登録内容：

- 作物名「移植水稻」に適用雑草名「ミスガヤツリ」を追加する。

【変更後】

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植水稻	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ヘラオモダカ ヒルムシロ セリ オモダカ クログワイ コウキヤガラ ミスガヤツリ	移植後3日～ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで	250g/10a	1回	湛水散布 又は 湛水周縁散布

ピラコニルを含む 農薬の総使用回数	ピリミスルファンを含む 農薬の総使用回数	フェニキシルホンを含む 農薬の総使用回数
2回以内	2回以内	2回以内

注意事項の変更：

【変更前】

- 本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの2.5葉期までに、時期を失しないように散布すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に散布すること。ヘラオモダカ、ウリカワは2葉期まで、ホタルイは3葉期まで、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラは発生始期まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生始期までが本剤の散布適期である。

【変更後】

- 本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの2.5葉期までに、時期を失しない

ように散布すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に散布すること。ヘラオモダカ、ウリカワ、ミズガヤツリは2葉期まで、ホタルイは3葉期まで、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラは発生始期まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生始期までが本剤の散布適期である。

以 上