

平成29年8月30日  
クミアイ化学工業株式会社  
企画普及部普及課

## 登録速報

下記の通り適用拡大登録となりましたので、ご連絡します。

### 記

農薬名：クミアイダイアメリットDF（登録番号：第21355号）

適用拡大登録月日：平成29年8月30日

適用拡大登録内容：

- 作物名「きゅうり」のイミノクタジンを含む農薬の総使用回数を「7回以内」に変更する。
- 作物名「いちご」について次のとおり変更する。
  - イミノクタジンを含む農薬の総使用回数を「10回以内(育苗期は5回以内、本圃では5回以内)」に変更する。
  - 使用時期「収穫開始14日前まで」の本剤の使用回数を「3回以内」に変更する。
- 使用液量を記載し、【変更後】のとおりとする。
- 作物名「トマト」に適用病害虫名「アザミヤ類」を追加する。
- 作物名「なす」に適用病害虫名「アザミヤ類」を追加する。

【変更後】

| 作物名  | 適用<br>病害虫名                                       | 希釈<br>倍数               | 使用液量               | 使用時期       | 本剤の<br>使用<br>回数                          | 使用<br>方法 | ミネタジンを<br>含む農薬の<br>総使用回数 | ホリキンを<br>含む農薬の<br>総使用回数 |      |
|------|--|------------------------|--------------------|------------|--|----------|--------------------------|-------------------------|------|
| きゅうり | うどんこ病<br>菌核病                                     | 1000<br>～<br>1500<br>倍 | 100～300<br>L/10a   | 収穫前日<br>まで | 2回<br>以内                                 | 散布       | 7回以内                     | 2回以内                    |      |
|      | 灰色かび病<br>褐斑病<br>炭疽病                              | 1000<br>倍              |                    |            |  |          |                          |                         |      |
| トマト  | 灰色かび病<br>すすかび病<br>うどんこ病<br>葉かび病<br>菌核病<br>アザミヤカ類 | 1500<br>倍              |                    |            | 3回<br>以内                                 |          | 3回以内                     | 3回以内                    | 3回以内 |
| なす   | 灰色かび病<br>すすかび病<br>菌核病                            | 1000<br>～<br>1500<br>倍 |                    |            |  |          |                          |                         |      |
|      | アザミヤカ類   | 1000<br>倍              |                    |            |  |          |                          |                         |      |
|      | うどんこ病  |                        |                    |            |  |          |                          |                         |      |
| メロン  | うどんこ病<br>つる枯病                                    | 1500<br>倍              |                    |            | 5回<br>以内                                 |          | 5回以内                     | 5回以内<br>(塗布は<br>1回以内)   |      |
| ねぎ   | さび病<br>黒斑病                                       |                        |                    |            | 収穫<br>30日前<br>まで                         |          | 3回<br>以内                 | 3回以内                    | 3回以内 |
| いちご  | うどんこ病  | 2000<br>倍              | 育苗期<br>(定植前)       | 1回         | 10回以内<br>(育苗期は<br>5回以内、<br>本圃では<br>5回以内) |          |                          |                         |      |
|      |  |                        | 収穫開始<br>14日前<br>まで | 3回<br>以内   |  |          |                          |                         |      |

注意事項の変更：

【変更後】

- 散布液調製の際はよく攪拌すること。
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。
- 本剤はイミノクタジンを含む農薬であるので、他のイミノクタジンを含む農薬の使用回数と合わせ、作物ごとの総使用回数の範囲内で使用すること。
- メロンに使用する場合、交配 2～3 日前から交配 2 週間後までの幼果の時期には、薬害を生じるおそれがあるので、この時期の散布はさける。また、若葉への散布や高温時の散布では、薬害を生じることがあるので注意する。
- ばらに対して薬害を生じるので、かからないように注意して散布すること。
- 蚕に対して毒性があるので、桑にかからないように注意して散布すること。
- 散布量は、対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節すること。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

以上