

登録速報

下記の通り適用拡大登録となりましたので、ご連絡します。

記

農薬名：ヤブサメ1キロ粒剤（登録番号：第23818号）

適用拡大登録月日：平成29年9月13日

適用拡大登録内容：

- 作物名「移植水稻」の適用雑草名に「コウキヤガラ」を追加する。
- 作物名「直播水稻」を追加する。

【変更後】

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植水稻	水田一年生雑草 及び マツバイ ホトイ ウリカワ ミスガヤツリ ヘラオモダカ ヒルムシロ セリ オモダカ クログワイ コウキヤガラ	移植直後～ヒエ3葉期 但し、移植後30日まで	1kg/10a	1回	湛水散布
		移植時			田植同時散布機 で施用
直播水稻	水田一年生雑草 及び ホトイ ウリカワ ミスガヤツリ ヒルムシロ セリ	稲1葉期～ヒエ2葉期 但し収穫90日前まで			湛水散布

ピラクロルを 含む農薬の総使用回数	ピリミルファンを 含む農薬の総使用回数	フェニサルホンを 含む農薬の総使用回数
2回以内	2回以内	2回以内

注意事項の変更：

【変更後】

- 本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの3葉期（直播水稻は2葉期）までに、時期を失しないように散布すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に散布すること。ヘラオモダカ、ウリカワは2葉期まで、ホタルイは3葉期まで、ミズガヤツリは4葉期まで、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラは発生始期まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生始期までが本剤の散布適期である。
- オモダカ、クログワイ、コウキヤガラは発生期間が長く、遅い発生のものまでは十分な効果を示さないで、必要に応じて有効な後処理剤との組み合わせで使用すること。
- 苗の植付けが均一となるように、代かきおよび植付作業はていねいにおこなうこと。未熟有機物を施用した場合は、特にていねいにおこなうこと。
- 散布の際は、水の出入りを止めて湛水状態のまま田面に均一に散布し、散布後3～4日間は通常の湛水状態（水深3～5cm）を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しはしないこと。また、入水は静かにおこなうこと。
- 以下のような条件下では薬害が発生するおそれがあるので使用をさけること。
 - 砂質土壌の水田および漏水田（減水深が2cm/日以上）
 - 軟弱苗を移植した水田
 - 極端な浅植えの水田および浮き苗の多い水田
 - 植穴の戻りの悪い水田
- 直播水稻に使用する場合、以下の点に注意すること。
 - 発芽直後の稲に対して薬害を生じるおそれがあるので、適切な覆土を行い、稲の1葉期以降に散布すること。
 - 稲の根が露出した条件では薬害を生じるおそれがあるので使用をさけること。
 - 除草効果の低下と生育抑制の薬害が発生するおそれがあるので、水持ちの安定した後に散布すること。
- 梅雨時期等、散布後に多量の降雨が予想される場合は、除草効果が低下するおそれがあるので使用をさけること。
- 散布後の数日間に著しい高温が続く場合、初期生育が抑制されることがあるが、一過性のもので次第に回復し、その後の生育に対する影響は認められていない。
- 本剤を散布した水田の田面水を他の作物の灌水に使用しないこと。
- 本剤はその殺草特性から、いぐさ、れんこん、せり、くわいなどの生育を阻害するおそれがあるので、これらの作物の生育期に隣接田で使用する場合は十分に注意すること。
- いぐさ栽培予定水田では使用しないこと。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意するほか、別途提供されている技術情報も参考にして使用すること。特に初めて使用する場合や異常気象の場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

以上