

各位

全3ページ
登録速報(2019-145)
2019年 6月26日
クミアイ化学工業株式会社
企画普及部普及課

登録速報

下記の通り適用拡大登録となりましたので、ご連絡します。
適用拡大登録年月日：2019年 6月26日

記

1. 農薬の登録番号及び名称

登録番号： 第20863号

名称： ランネート45DF (宇都宮化成工業(株)登録)

2. 変更の内容

農薬登録申請書第7項中、以下の事項を変更し、表1<変更前>を表2<変更後>とする。

- ・作物名「ねぎ(クロバネキノコバエ類)」の希釈倍数に「1000倍」を追加し、「1000~2000倍」とする。
- ・作物名「にんじん」の適用害虫名に「クロバネキノコバエ類」を追加する。

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ミミル を含む 農薬の総使 用回数
ねぎ	ヨトウムシ	1000倍	100~300 L/10a	収穫7日前 まで	4回以内	散布	4回以内
	クロバネキノコバエ類 アザミヤ	1000~2000倍					
にんじん	ヨトウムシ ハスモンヨトウ アブラムシ類 クロバネキノコバエ類	1000倍		収穫前日 まで	2回以内		2回以内 (は種前の土 壌混和は1回 以内)

3. 当該変更に伴い、農薬登録申請書の記載事項に変更を生ずるときは、その旨及び内容

なし

<変更後>

作物名	通用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ミミルを含む農薬の総使用回数	
かぼちゃ	ワアブラムシ	1000倍	100~300 L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	
いちご	イチゴ地中ムシ イチゴセチュウ			1~2L/m ² 2~3L/m ²	育苗期 定植後 生育初期		4回以内	灌注
	イチゴネグサレセンチュウ コガムシ類幼虫	移植活着後 (育苗期)						
ピーマン (露地栽培)	タバコガ ハモンヨトウ	1000~2000倍	100~300 L/10a	収穫開始14日前まで	3回以内	散布	3回以内	
キャベツ	アオムシ コガ ヨトウムシ ハモンヨトウ アブラムシ類 タマギンクワバ			収穫14日前まで				
	はくさい			アオムシ コガ ヨトウムシ アブラムシ類				2回以内 (は種時の 土壌混和は 1回以内)
こまつな				アブラムシ類				3回以内
かぶ	アオムシ アブラムシ類	1000倍	100~300 L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内	
レタ	ヨトウムシ アブラムシ類	1000~2000倍		収穫21日前まで			2回以内	2回以内 (植付時の 土壌混和は 1回以内)
	オタバコガ ナメクジ類	1000倍						
サラダ菜	ヨトウムシ アブラムシ類 オタバコガ	1000~2000倍						
カブナー	ヨトウムシ アブラムシ類	1000倍	収穫7日前まで	2回以内	2回以内			
ブロッコリー	ヨトウムシ アブラムシ類	1000~2000倍	収穫14日前まで					
ほうれんそう	ヨトウムシ ミナキイロアザミウマ アブラムシ類			1000倍	4回以内	4回以内		
ねぎ	シイゾクヨトウ クワバネキコバエ類	1000~2000倍	収穫7日前まで					
たまねぎ	ネギアザミウマ							
しょうが	ハモンヨトウ							
だいこん	アオムシ コガ アブラムシ類 ハマダラメバ	1000~2000倍	100~300 L/10a	収穫21日前まで	2回以内	2回以内 (は種時の 土壌混和は 1回以内)		

(つづき)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ミミルを含む農薬の総使用回数	
ばれいしょ	ジヤガイガ ナストビハムシ ニジュウヤクシトウ アブラムシ類	1000倍	100~300 L/10a	収穫7日前 まで	5回以内	散布	5回以内	
かんしょ	ハモンヨトウ ナガジロシバ	1000~2000倍		収穫14日 前まで	4回以内		4回以内	
だいず	ハモンヨトウ シロイモジ マダラメイガ マメシクシガ カメムシ類 ツメクサガ			収穫7日前 まで	3回以内		3回以内	
えだまめ	ヨトウムシ ビハムシ			5回以内	5回以内		5回以内	
てんさい	ヨトウムシ ハモンヨトウ アブラムシ類 クロバネキノコバエ類			1000倍	収穫前日 まで		2回以内	2回以内 (は種前の 土壌混和 は1回以 内)
パセリ	アブラムシ類	2000倍		収穫30日 前まで	1回		1回	
茶	ハモンヨトウ チャゲコゾリ	1000倍	200~400 L/10a	摘採21日 前まで	2回以内	2回以内		
	コカモンハキ チャハマキ チャノホガ ミドリヒメコバエ	1000~1500倍						
	チャノキイロアザミウマ ツマクノアオカスミカメ	1000~2000倍						
食用ゆり	クロバネキノコバエ類	500倍	-	植付前	1回	30分間 種球浸漬	1回	
セルリー	ヨトウムシ ハモンヨトウ アブラムシ類	1000倍	100~300 L/10a	収穫30日 前まで	2回以内	散布	2回以内	
アスパラガス	ネギアザミウマ			収穫前日 まで	1回		灌注	2回以内 (散布は 1回以内、 灌注は1回 以内)
	ナメタジ類		1~3L/m ²	収穫3日 前まで				
にら	ネギアザミウマ		1L/m ²	100~300 L/10a	収穫21日 前まで	2回以内	散布	2回以内
らっきょう	タネニ類							
ごぼう	アブラムシ類		1000~2000倍	25~180 L/10a	収穫7日 前まで	2回以内	散布	2回以内
チゲンサイ		収穫14日 前まで						
たばこ	タバコガ ヨトウムシ ハモンヨトウ	1000~2000倍	25~180 L/10a	収穫10日 前まで				

以上