

各位

全3ページ
登録速報(2021-046)
2021年 1月15日
クミアイ化学工業株式会社
企画普及部普及課

登録速報

下記の通り適用拡大登録となりましたので、ご連絡します。

適用拡大登録年月日：2021年1月13日

記

1. 農薬の登録番号及び名称

登録番号：第23101号

名称：ジャストフィットフロアブル（バイエルクロップサイエンス(株)登録）

2. 変更の内容

農薬登録申請書第7項に以下の内容を追加・変更し、変更後のとおりとする。

- ① 作物名「レタス」及び「非結球レタス」の使用時期を「定植当日」から「定植前日～定植当日」に変更する。
- ② 作物名「はくさい」に適用病害虫名「白さび病」を追加する。

【変更後】（変更する作物のみ抜粋）

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルセコリドを含む農薬の総使用回数	ベンチアザリカルグイソプロピルを含む農薬の総使用回数
はくさい	べと病 白さび病	5000 倍	100～300L/10a	収穫 7 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内	3 回以内
レタス 非結球レタス	べと病	500 倍	セル成型育苗トレイ 1 箱またはペーパーポット 1 冊（約 30×60cm、使用土壌約 1.5～4L） 当り 0.5L	定植前日～ 定植当日	1 回	灌注	3 回以内 （灌注は 1 回以内、散布は 2 回以内）	3 回以内 （灌注は 1 回以内、散布は 2 回以内）
		5000 倍	100～300L/10a	収穫前日まで	2 回以内	散布		

3. 当該変更に伴い、農薬登録申請書の記載事項に変更を生ずるときは、その旨及び内容
農薬登録申請書第 8 項に（5）を次のとおり追加し、別紙のとおりとする。

【追加】

- （5）灌注処理する場合は、軟弱徒長苗、未熟苗、高温乾燥時や過剰使用により葉縁に褐変や黄化などの薬害を生じるおそれがあるので注意すること。
また、本剤が土壌に十分吸収されないおそれがあるので処理直前や直後の灌水はさけること。

別紙

- (1) 散布液調製時には、ビンをよく振って内部の成分をよく攪拌してから薬量を計ること。
- (2) 調製した薬液は、調製した当日に使い切ること。
- (3) 本剤を無人航空機による散布に使用する場合は次の注意事項を守ること。
 - 1) 散布は散布機種 of 散布基準に従って実施すること。
 - 2) 散布に当っては散布機種に適合した散布装置を使用すること。
 - 3) 散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行うこと。
- (4) 使用液量は、対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせて調節すること。
- (5) 灌注処理する場合は、軟弱徒長苗、未熟苗、高温乾燥時や過剰使用により葉縁に褐変や黄化などの薬害を生じるおそれがあるので注意すること。また、本剤が土壤に十分吸収されないおそれがあるので処理直前や直後の灌水はさけること。
- (6) あんずに対して薬害を生じるおそれがあるので、付近にある場合はかからないように注意すること。
- (7) 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにすること。
- (8) 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

以上